

## ASSOCIAÇÃO DO USO DE ANTICONCEPCIONAIS ORAIS E CASOS DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

<sup>1</sup>Gabriela de Menezes Barbosa, <sup>2</sup>Jaqueline Villar da Rocha, <sup>3</sup>Rebeca de Vasconcelos Pimentel Barbosa, <sup>4</sup>Maria da Conceição Ribeiro Simões

<sup>1</sup>Acadêmica do curso de medicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, gabimenezes1103@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2945408962632471>; <sup>2</sup>Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, jaqueline\_villar@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7620595789661780>; <sup>3</sup>Acadêmica do curso de Medicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, rebecapimentel\_1@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2721859646981040>; <sup>4</sup>Doutora em Ciências da Saúde, Ginecologista-obstetra – RQE N° 261, Médica do trabalho – RQE N° 2154, CRM/RO 596 TEGO 261/2003, Coordenadora Geral do Curso de Medicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, [conceicaosimoes@uol.com.br](mailto:conceicaosimoes@uol.com.br), <http://lattes.cnpq.br/7288432047491858>.

**INTRODUÇÃO:** A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença considerada potencialmente grave e que se trata da formação de coágulos (trombos) no interior de veias profundas ocasionada por fatores genéticos e também fatores adquiridos. Sabe-se que a ocorrência da TVP pode levar a complicações graves como embolia pulmonar e síndrome pós-trombótica. O uso de hormônios sintéticos como estrógeno e progesterona, seja na forma de contraceptivos orais ou como tratamentos hormonais, apresentam indícios de desenvolvimento da trombose venosa profunda na população feminina. **OBJETIVOS:** O objetivo geral compreende analisar as informações da literatura especializada, acerca da relação entre o uso dos anticoncepcionais orais com o surgimento da trombose venosa profunda nas mulheres, especificando a caracterização da trombose venosa profunda relacionando a sua origem diante do consumo de anticoncepcionais orais. **METODOLOGIA:** O trabalho foi produzido em cima de uma revisão bibliográfica em periódicos da área de Saúde, com publicações relevantes para a problemática da pesquisa. As publicações foram selecionadas principalmente na internet, fazendo uso do recorte de tempo entre 2013 e 2021. **RESULTADOS:** Os resultados sugerem que o uso de certos tipos de pílulas anticoncepcionais aumenta muito a chance de desenvolver trombose arterial, condição que pode levar a acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio. O risco de trombose venosa é três a seis vezes maior quando se toma anticoncepcionais orais. **CONCLUSÃO:** A trombose venosa profunda é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. Para as mulheres, há uma exposição constante e muito frequente aos anticoncepcionais orais, que são usados para prevenir a gravidez e, em alguns casos, para tratar distúrbios hormonais que afetam apenas as mulheres.

**Palavras-chave:** Trombose Venosa Profunda, Fatores de Coagulação, Anticoncepcionais, Efeitos colaterais, Anticoncepcionais orais combinados.